



دستورالعمل نحوه تجویز قطره گوش

دستور پزشکی (پرونده و کاردکس) را بررسی کنید و به اصول صحیح دارودرمانی توجه کنید.

مددجو را شناسایی کنید ، با وی ارتباط برقرار کنید، هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.

وسایل مورد نیاز را آماده کنید: دستکش، قطره گوش مناسب، اپلیکاتور یا پنبه ، نرمال سالین

نام، تاریخ انقضاء و سایر مشخصات داروی مورد نظر را چک کنید.

دستها را بشویید.

دستکش یکبار مصرف بپوشید.

گوش مورد نظر را مشخص کنید و مددجو را به طرف گوش سالم بخوابانید.

گوش خارجی و مجرای گوش را از نظر هرگونه آسیب یا تغییر رنگ و ترشح بررسی نمایید.

مجرای گوش مددجو را توسط اپلیکاتور ، پنبه یا نرمال سالین تمیز کنید.

لاله گوش را به طرف بالا و عقب (در بالغین) و یا به طرف پایین و عقب (در اطفال) بکشید.

دارو را انتخاب کنید و برچسب نام، دوز دارو و تاریخ انقضاء را با دقت بخوانید.

قطره چکان را یک سانتی متر بالاتر از مجرای گوش قرار دهید و دارو را بچکانید.

از مددجو درخواست کنید مدت ۲ تا ۳ دقیقه در پوزیشن پهلو باقی بماند.

دستکش ها را بیرون بیاورید.

وسایل آلوده را جمع آوری کنید و مددجو را در پوزیشن راحت قرار دهید.

زمان، مقدار، محل تجویز و عکس العمل دارویی مددجو را در برگه گزارش مددجو ثبت کنید.

تصاویر نحوه تجویز قطره گوش

مراحلی از فرایند ریختن قطره گوش



دستکش یکبار مصرف بپوشید.



دستها را بشویید.



مجرای گوش مددجو را توسط اپلیکاتور ، پنبه و یا نرمال سالین تمیز کنید.



گوش خارجی و مجرای گوش را از نظر هرگونه آسیب یا تغییر رنگ ترشح بررسی نمایید.



لاله گوش را در اطفال به طرف پایین و عقب بکشید.



لاله گوش را در بالغین به طرف بالا و عقب بکشید.



از مددجو درخواست کنید مدت ۲ تا ۳ دقیقه در پوزیشن پهلو باقی بماند.



قطره چکان را یک سانتی متر بالاتر از مجرای گوش قرار دهید و دارو را بچکانید.