

دستور العمل گاوژ و لاواژ



دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

دستور پزشک (کاردکس و پرونده) را بررسی کنید.



مددجو را شناسایی، با وی ارتباط برقرار کنید و هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.



وسایل را آماده کنید:

گاوژ: ظرف مدرج حاوی مقدار مناسب غذا یا دارو با حرارت مناسب، سرنگ ۵۰ تامی (گاوژ)، دستکش یکبار مصرف، رسیور، حوله یا پد یکبار مصرف، لیوان آب با درجه حرارت اتاق/لاواژ: محلول شستشو (نرمال سالین)، سطل یا کیسه ی تخلیه، ست سرم، دستکش یکبار مصرف



قبل از انجام کار دستها را بشوید و دستکش تمیز یکبار مصرف بپوشید.



مددجو را در حد امکان در وضعیت نشسته قرار دهید و حوله را روی سینه ی بیمار قرار دهید.



از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید.



شستشوی معده (لاواژ):

- ۱- محلول شستشو با درجه حرارت محیط را به ست سرم و بعد از هواگیری سر آن را به لوله ی معده وصل کنید.
- ۲- کلمپ را باز کنید تا محلول به سرعت تخلیه شود.
- ۳- حجم مایع را به درستی تنظیم کنید. (در هر نوبت نباید بیش از 300-50 cc مایع شستشو برای بیمار دچار مسمومیت دارویی استفاده شود).
- ۴- پس از هر نوبت لاواژ انتهای لوله ی معده را از سرم جدا کرده و به کیسه ی تخلیه متصل کنید و اجازه دهید تا محتویات خارج شود سپس دوباره کار را انجام دهید.
- ۵- شستشو را تا جایی ادامه دهید که مایع برگشتی صاف و شفاف شود و یا طبق دستور پزشک ادامه و یا قطع شود.

غذا دادن از طریق سوند معده (گاوژ)

- ۱- مقدار باقیمانده ی غذا در معده را در سرنگ بکشید و مقدار آن را مشخص کنید.
- ۲- مایع گاوژ را در حجم و مقدار مناسب آماده کنید. مقدار باقیمانده ی غذا از نوبت قبل را از این مقدار کم کنید. در صورتی که حجم آن کمتر از ۱/۴ حجم غذای قبلی باشد.
- ۳- لوله ی معده را کلمپ کنید تا از ورود هوا به معده جلوگیری شود.
- ۴- سرنگ را از انتهای لوله جدا کنید و پیستون را از داخل سرنگ خارج کنید و سپس مجدداً آن را به انتهای لوله وصل کنید و از آن به عنوان قیف استفاده کنید.
- ۵- غذا را داخل سرنگ ریخته کلمپ را باز کنید و اجازه دهید مایع گاوژ طبق نیروی جاذبه به آرامی و در مدت ۱۰-۱۵ دقیقه وارد لوله شود.
- ۶- سرعت مواد غذایی را با کم یا زیاد کردن ارتفاع سرنگ کنترل نمایید فاصله ی 40-45cm از سطح شکم مناسب است.
- ۷- سرنگ را به لوله وصل کرده و ۲۰-۳۰ cc آب ولرم در سرنگ بریزید تا سرنگ شسته شود
- ۸- قبل از تمام شدن آب، لوله ی معده را کلمپ کنید و مجدداً به سرنگ پیستون دار وصل کنید
- ۹- بیمار را به مدت ۳۰ دقیقه در وضعیت نشسته قرار دهید و تحت نظر باشد.

دستکش ها را خارج کنید.



وسایل را جمع آوری کنید، مددجو را در وضعیت مناسب قرار دهید.




مشاهدات خود را ثبت کنید.

تصاویر نحوه ی گاوژ و لاواژ




از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید.

سرنگ تامی



جهت لاواژ : غذا را داخل سرنگ ریخته کلمپ را باز کنید و اجازه دهید مایع گاوژ طبق نیروی جاذبه به آرامی و در مدت ۱۰-۱۵ دقیقه وارد لوله شود.



Source: Reichman EF: *Emergency Medicine Procedures*, Second Edition: www.accessemergencymedicine.com
Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

جهت گاوژ : محلول شستشو با درجه حرارت محیط را به ست سرم و بعد از هواگیری سر آن را به لوله ی معده وصل کنید.