

دستور العمل تجویز شیاف رکتالی

دستور پزشک (کاردکس و پرونده) را بررسی کنید و به اصول صحیح دارودرمانی توجه کنید.

مددجو را شناسایی و با وی ارتباط برقرار کنید ، هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.

وسایل را آماده کنید : ژل لوبریکنت، شیاف مناسب، دستکش یکبار مصرف ، گاز

نام و تاریخ انقضاء و سایر مشخصات داروی مورد نظر را بررسی کنید.

محیط را خصوصی کنید و بدن مددجو را بپوشانید.

دستها را بشویید.

دستکش یکبار مصرف بپوشید.

مددجو را در وضعیت پهلوئی چپ قرار دهید.

آنوس را از نظر هر گونه آسیب یا تغییر رنگ و ترشح بررسی کنید.

شیاف را از داخل پوشش آن خارج کنید.

سر شیاف را به ژل لوبریکنت آغشته کنید.

انگشت اشاره خود را به ژل لوبریکنت آغشته کنید.

جهت شل شدن اسفنکتر آنوس و تسهیل شیاف گذاری ، از مددجو درخواست کنید یک نفس عمیق بکشد.

شیاف را در امتداد رکتوم تا حدود ۱۰ سانتی متر در بالغین و ۵ سانتی متر در اطفال توسط انگشت اشاره جلو برانید.

انگشت را خارج کنید و آنوس را توسط گاز تمیز کنید..

از مددجو درخواست کنید به مدت ۵ دقیقه در وضعیت خوابیده به پشت بماند و برای چند لحظه دو طرف باسن را به هم نزدیک کرده و با دست نگه دارد

دستکش را از دستها خارج کنید.

وسایل آلوده را جمع آوری کنید.

ناحیه آنوس را بعد از ۵ دقیقه از نظر خروج احتمالی شیاف از محل بررسی نمایید.

دستها را بشویید.


زمان ، مقدار تجویز دارو و عکس العمل دارویی مددجو را در برگه گزارش مددجو ثبت کنید.

تصاویر نحوه تجویز شیاف رکتالی


وسایل را آماده کنید : ژل لوبریکانت ، شیاف مناسب، دستکش یکبار مصرف



شیاف را از داخل پوشش آن خارج کنید.




مددجو را در وضعیت یک پهلو قرار دهید. آنوس را از نظر آسیب یا تغییر رنگ و ترشح بررسی کنید.




سرسیاف را به ژل لوبریکانت آغشته کنید.



انگشت اشاره خود را به ژل لوبریکانت آغشته کنید.



شیاف را در امتداد رکتوم تا حدود ۱۰ سانتی متر در بالغین و ۵ سانتی متر در اطفال توسط انگشت اشاره جلو برانید.



از مددجو درخواست کنید یک نفس عمیق بکشد.



دستها را بشویید.



از مددجو درخواست کنید به مدت ۵ دقیقه در وضعیت خوابیده به پشت بماند