



دستورالعمل نحوه استفاده از اسپری (MDI)

دستور پزشک (پرونده و کاردکس) را چک کنید و به اصول دارودارمانی توجه کنید.



مددجو را شناسایی و با وی ارتباط برقرار کنید . هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.



وسایل مورد نیاز را آماده کنید: اسپری ، دستکش تمیز، دمیار در صورت نیاز

دستها را بشویید



توانایی انجام پروسیجر را در مددجو بررسی کنید.



از مددجو بخواهید ۶ - ۵ بار اسپری (MDI) را محکم تکان دهید.



از مددجو بخواهید در صورت وجود دمیار، محفظه دمیار را از نظر اجسام خارجی و صحت بررسی کنید و MDI را در انتهای محفظه قرار دهد.



از مددجو بخواهید دستگاه را با انگشت شست در قسمت دهانی و با انگشتان میانی و سبابه در قسمت بالایی گرفته و آن را در فاصله 2-4 cm جلوی دهان قرار دهد.



از مددجو بخواهید بازدم عمیق انجام دهد و لب ها اطراف قسمت دهانی قرار دهد. (لب ها کاملاً قسمت دهانی را باید بپوشانند).



به مددجو آموزش دهید که سر را کمی به عقب خم کرده و همزمان با فشردن مخزن، دارو

به آرامی و عمیق برای ۵ - ۳ ثانیه نفس عمیق بکشد و برای ۱۰ ثانیه نفس خود را نگه دارد.



از مددجو بخواهید MDI را کنار بگذارد و با لب های غنچه بازدم را انجام دهد.



به مددجو آموزش دهید بین هر پاف ۶۰ ثانیه و بین هر داروی استنشاقی ۵ - ۱۵ دقیقه یا طبق دستور پزشک فاصله دهد.



به مددجو آموزش دهید که ممکن است به علت ذرات دارو احساس اق زدن داشته باشد و در صورت نیاز پس از مصرف اسپری شستشوی دهان را انجام دهد



به مددجو آموزش دهید که یکبار در روز دستگاه و در پوش آن باید در آب گرم شسته و خشک شود.



به مددجو آموزش دهید دو بار در هفته قسمت L شکل پلاستیکی باید با آب ولرم و صابون شست و شو

شود و پیش از قرار دادن مجدد مخزن دارو در آن، این قسمت را به خوبی بشویید و خشک کند.



دستکش ها را خارج کنید



وسایل را جمع آوری کنید.



دستها را بشویید.




نوع دارو ، ساعت تزریق و عکس العمل تزریق را طبق مقررات مؤسسه در گزارش پرستاری ثبت کنید.

تصاویر نحوه استفاده از اسپری



مراحل استفاده از داروی استنشاقی



(۱) از مددجو بخواهید ۶ – ۵ بار اسپری (MDI) را محکم تکان دهید.

(۲) از مددجو بخواهید در صورت وجود دمیار، محفظه دمیار را از نظر اجسام خارجی و صحت بررسی کنید و MDI را در انتهای محفظه قرار دهد.

(۳) از مددجو بخواهید دستگاه را با انگشت شست در قسمت دهانی و با انگشتان میانی و سبابه در قسمت بالایی گرفته و آن را در فاصله ۲-۴ cm جلوی دهان قرار دهد.

(۴) از مددجو بخواهید بازدم عمیق انجام دهد و لب ها را اطراف قسمت دهانی قرار دهد. (لب ها کاملاً قسمت دهانی را باید بپوشانند).

(۵) به مددجو آموزش دهید که سر را کمی به عقب خم کرده و همزمان با فشردن مخزن، دارو به آرامی و عمیق برای ۵ – ۳ ثانیه نفس عمیق بکشد و برای ۱۰ ثانیه نفس خود را نگه دارد.

(۶) از مددجو بخواهید MDI را کنار بگذارد و با لب های غنچه بازدم را انجام دهد.