

دستور العمل تجویز دارو از طریق سوند معده

دستور پزشک (کاردکس و پرونده) را بررسی و به اصول دارو درمانی توجه کنید



مددجو را شناسایی ، با وی ارتباط برقرار کنید و هدف و روش انجام کار را برای وی شرح دهید.



وسایل را آماده کنید :

گاوآژ: هاون ، ظرف مدرج حاوی مقدار مناسب دارو با حرارت مناسب، سرنگ ۵۰ تامی (گاوآژ)،

دستکش یکبار مصرف، رسیور، حوله یا پد یکبار مصرف، لیوان آب با درجه حرارت اتاق

قبل از انجام کار دستها را بشویید و دستکش تمیز یکبار مصرف بپوشید.



مددجو را در حد امکان در وضعیت نشسته قرار دهید و حوله را روی سینه ی بیمار قرار دهید.



از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید.



- داروی مورد نظر در آماده نموده و در هاون کوبیده تا بصورت پودری نرم درآید .
- داروی پودر شده را در حجم مناسب آب حل و آماده کنید.
- لوله ی معده را کلمپ کنید تا از ورود هوا به معده جلوگیری شود.
- سرنگ را از انتهای لوله جدا کنید و پیستون را از داخل سرنگ خارج کنید و سپس مجدداً آن را به انتهای لوله وصل کنید و از آن به عنوان قیف استفاده کنید.
- غذا را داخل سرنگ ریخته کلمپ را باز کنید و اجازه دهید دارو طبق نیروی جاذبه به آرامی و در مدت ۱۰-۱۵ دقیقه وارد لوله شود.
- سرعت مواد غذایی را با کم یا زیاد کردن ارتفاع سرنگ کنترل نمایید فاصله ی 40-45cm از سطح شکم مناسب است.
- سرنگ را به لوله وصل کرده و ۲۰-۳۰ CC آب ولرم در سرنگ بریزید تا سرنگ شسته شود
- قبل از تمام شدن آب، لوله ی معده را کلمپ کنید و مجدداً به سرنگ پیستون دار وصل کنید
- بیمار را به مدت ۳۰ دقیقه در وضعیت نشسته قرار دهید و تحت نظر باشد.



دستکش ها را خارج کنید.



وسایل را جمع آوری کنید ، مددجو را در وضعیت مناسب قرار دهید.



مشاهدات خود را ثبت کنید.



تصاویر نحوه ی تجویز دارو از طریق سوند معده



از قرارگیری سوند در معده اطمینان حاصل کنید.



سرنگ تامی



دارو را داخل سرنگ ریخته کلمپ را باز کنید و اجازه دهید مایع گاوآژ طبق نیروی جاذبه به آرامی و در مدت ۱۰-۱۵ دقیقه وارد لوله شود.